


Ի՞ՆՉ Է ԳԱՂՏՆԻ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԸ (LTBI)

ԲՈՒԺԱՌՈՒԻ ՌԻՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ




(Armenian)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

Բովանդակություն

1. Ի՞նչ է գաղտնի (լատենտ) տուբերկուլոզային վարակը (LTBI)	5
2. Ո՞րն է գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի և տուբերկուլոզ հիվանդության տարբերությունը	5
3. Ինչպե՞ս են տուբերկուլոզի մանրէները հայտնվում մարմնի մեջ	6
4. Ո՞վ ունի գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ ձեռք բերելու ավելի մեծ հավանականություն	6
5. Ինչպես է ախտորոշվում գաղտնի տուբերկուլոզային վարակը	7
6 . Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժումը	8
7. Որքա՞ն ժամանակ պետք է ընդունեմ գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեղերը	9-11
8. Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժման կարևորությունը՝ ակտիվ տուբերկուլոզ հիվանդությունը կանխելու համար	12
9. Ինչու է կարևոր ընդունել գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բոլոր դեղերը	12
10. Սնունդ, որը պետք է ուտել, երբ ընդունում եք գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեղեր	13
11. Ինչպես հոգ տանել ձեր մասին. մարզանք, շնչառություն և ինքնախնամք	14
12. Հիվանդների վկայություններ	15
13. «Մենք ենք տուբերկուլոզը». տուբերկուլոզը վերապրածներ և շահերի պաշտպաններ	15
Հաճախակի տրվող հարցեր	16
Տեղեկություններ Հանրային Առողջության տուբերկուլոզի կլինիկայի մասին	17





1. Ի՞նչ է գաղտնի (լատենտ) տուբերկուլոզային վարակը (LTBI)

- Տուբերկուլոզային վարակ ունեցող մարդկանց օրգանիզմում կա տուբերկուլոզի մանրէ, բայց նրանք չունեն տուբերկուլոզ հիվանդություն: «**Գաղտնի**» կամ «**Լատենտ**» բառերը մեկ բառեր են «**չգործող**» տուբերկուլոզային վարակի համար:
- Մանրէները կարող են թաքնված մնալ ձեր մարմնում ու լինել «քնած», և արդյունքում դուք չեք հիվանդանում կամ դրանք փոխանցում ուրիշներին: Սակայն եթե ձեր օրգանիզմը թուլանա, մանրէները «կարթնան», **կակտիվանան** և ձեզ կհիվանդացնեն: Սա տուբերկուլոզ հիվանդությունն է: Ցանկացած մարդ կարող է ձեռք բերել տուբերկուլոզի չգործող մանրէներ:
- Բուժումն օգնում է գաղտնի **չգործող** տուբերկուլոզ ունեցող մարդկանց հետագայում խուսափել տուբերկուլոզով հիվանդանալուց:

2. Ո՞րն է գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի և տուբերկուլոզ հիվանդության տարբերությունը

Ո՞րն է գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի (LTBI) և տուբերկուլոզ հիվանդության (TB) տարբերությունը	
Տուբերկուլոզային վարակ ունեցող անձ Ախտանիշներ չունի  Հիվանդ չէ  Հի կարող մանրէները փոխանցել ուրիշներին  Բուժումը կարող է կանխել հիվանդության առաջացումը 	Տուբերկուլոզով հիվանդ անձ Ախտանիշներ ունի  Հիվանդ է  Կարող է մանրէները փոխանցել ուրիշներին  Բուժումը կարող է վերացնել հիվանդությունը 





3. Ինչպե՞ս են տուբերկուլոզի մանրէները հայտնվում մարմնի մեջ

Տուբերկուլոզի մանրէները կարող են տարածվել օդում, երբ վատ օդափոխվող սենյակում՝ ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդը հազում, փռչում, ծիծաղում, խոսում կամ երգում է:

Եթե դուք շնչեք այդ օդը, մանրէները կարող են հայտնվել ձեր մարմնում:

Սկզբում տուբերկուլոզի մանրէները կարող են քսած մսալ ձեր մարմնում: Սա կոչվում է «գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ», և այն ձեզ չի հիվանդացնում կամ չի փոխանցվում այլ մարդկանց: Սակայն, եթե ձեր մարմինը թուլանա և չկարողանա լավ պայքարել մանրէների դեմ, տուբերկուլոզի մանրէները կարող են «արթնանալ» և ձեզ հիվանդացնել: Սա կոչվում է **ակտիվ** տուբերկուլոզ:

4. Ո՞վ ունի գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ (LTBI) ձեռք բերելու ավելի մեծ հավանականություն

Ցանկացած մարդ կարող է ձեռք բերել տուբերկուլոզի չգործող մանրէներ: Ավելի հավանական է, որ դուք ձեռք կբերեք դրանք, եթե կա հետևյալ գործոններից մեկը.



Ծնվել, ճամփորդել կամ բնակվել եք (ավելի քան 1 ամիս) մի երկրում, որտեղ տուբերկուլոզի ցուցանիշները բարձր են:



Պատրաստվում եք ընդունել կամ արդեն ընդունում եք դեղամիջոցներ, որոնք թուլացնում են ձեր պաշտպանությունը վարակների դեմ, օրինակ՝ քաղցկեղի բուժումը:



Կյանքի որևէ պահի սերտ շփում եք ունեցել վարակիչ տուբերկուլոզով հիվանդի հետ:



Անօթևան եք կամ գտնվում եք բանտում կամ նախկինում եղել եք այս վիճակներից մեկում:

Հավելյալ տեղեկություններ՝

https://www.cdc.gov/tb/media/Question_Answers_About_TB_English.pdf

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/TB-Risk-Assessment.aspx>

5. Ինչպես է ախտորոշվում գաղտնի տուբերկուլոզային վարակը

Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի թեստավորումը օգնում է մարդկանց առողջ մնալ, հատկապես, եթե նրանց շրջապատում եղել է կամ կա **ակտիվ** տուբերկուլոզով հիվանդ: Որոշ մարդկանց անհրաժեշտ է միայն մեկ թեստ, բայց որոշներն էլ հնարավոր է, որ ամեն տարի թեստ հանձնելու կարիք ունենան, եթե աշխատում են բարձր ռիսկի պայմաններում, ունեն առողջական խնդիրներ, ախտանիշներ կամ շփվել են ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդի հետ:

Երկու տեսակի թեստեր կան, որոնք կարող են որոշել՝ արդյոք մարդն ունի գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ



Տուբերկուլոզը (TB)
հայտնաբերող արյան թեստ



Տուբերկուլոզը (TB)
հայտնաբերող մաշկի թեստ

Հավելյալ տեղեկություններ՝
https://www.cdc.gov/tb/testing/blood-test.html#cdc_testing_how_to_get_tested-how-to-get-tested

6. Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժումը

Ինչո՞ւ պետք է ես բուժվեմ

Գաղտնի (լատենտ) տուբերկուլոզային վարակի դեպքում տուբերկուլոզի մանրէները կարող են մնալ չգործող, երբ առաջին անգամ դրանք մտնում են ձեր օրգանիզմ: Այս փուլում դուք ձեզ հիվանդ չեք զգում, որևէ ախտանիշ չեք ունենում և վարակը չեք փոխանցում ուրիշներին: Բայց, եթե ձեր իմունային համակարգը թուլանում է, բակտերիաները կարող են ակտիվանալ և ձեզ հիվանդացնել տուբերկուլոզով:

Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեմ դեղեր ընդունելն օգնում է ոչնչացնել տուբերկուլոզի մանրէները, որպեսզի դրանք «չարթնանան» և ձեզ չհիվանդացնեն: Դեղամիջոցը ձեզ առողջ է պահում, նաև օգնում է պաշտպանել ձեր ընտանիքն ու ընկերներին:



Հավելյալ տեղեկություններ՝

https://www.cdc.gov/tb/media/Question_Answers_About_TB_English.pdf

7. Որքա՞ն ժամանակ պետք է ընդունեմ գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեղերը

Եթե մարդն ունի թաքնված տուբերկուլոզային վարակ, նա ընդունում է դեղամիջոցներ, օրգանիզմն առողջ պահելու համար: Մարդկանց մեծ մասը կարիք է ունենում դեղերն ընդունել 3-4 ամիս: Սակայն երբեմն ոմանք կարիք են ունենում դեղերն ընդունել 3-9 ամիս՝ կախված ակտիվ տուբերկուլոզի ազդեցությունից, առողջական վիճակից և բժշկի խորհուրդներից:

Ահա գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեղամիջոցների մի քանի օրինակ.

Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժակարգը

	ԴԵՐԱՄԻԳՈՑ	ԺԱՄԱՆԱԿ	ՀԱՃԱՆԱ- ԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԴԵՐԱՇԱԾԵՐԻ ԸՆԴՀ. ԹԻՎԸ	ԴԵՐԱՇԱԾ ԵՎ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ
Նախընտրելի	ԻՀՈՒՆԻԱԶԻՆ՝ ԵՎ ՌԻՖԱՊԵՆՏԻՆ՝ (3HP)	3 ամիս	Շաբաթը մեկ	12	Զափահասներ և ≥12 տարեկան երեխաներ ԻՀՈՒՆ՝ 15 մգ/կգ՝ կրողացրած հաջորդ. 50 կամ 100 մգ-ը. առավելագույնը 900 մգ ՌԻՖԱՊ՝ 10-14.0 կգ՝ 300 մգ 14.1-25 կգ՝ 450 մգ 25.1-32.0 կգ՝ 600 մգ 32.1-49.9 կգ՝ 750 մգ ≥50.0 կգ՝ առավելագույնը 900 մգ 2-11 տարեկան երեխաներ ԻՀՈՒՆ՝ 25 մգ/կգ, առավելագույնը 900 մգ ՌԻՖԱՊ՝ տես վերևում
	ՌԻՖԱՊԵՆՏԻՆ՝ (4R)	4 ամիս	Ամեն օր	120	Զափահասներ՝ 10 մգ/կգ՝ առավելագույնը 600 մգ Երեխաներ՝ 15-20 մգ/կգ՝ առավելագույնը 600 մգ
	ԻՀՈՒՆԻԱԶԻՆ՝ ԵՎ ՌԻՖԱՊԵՆՏԻՆ՝ (3HP)	3 ամիս	Ամեն օր	90	Զափահասներ ԻՀՈՒՆ՝ 5 մգ/կգ՝ առավելագույնը 300 մգ ՌԻՖԱՊ՝ 10 մգ/կգ՝, առավելագույնը 600 մգ Երեխաներ ԻՀՈՒՆ՝ 10-20 մգ/կգ՝ առավելագույնը 300 մգ ՌԻՖԱՊ՝ 15-20 մգ/կգ՝ առավելագույնը 600 մգ
Այլընտրանքային	ԻՀՈՒՆԻԱԶԻՆ՝ (6H/9H)	6 ամիս	Ամեն օր	180	Զափահասներ Ամեն օր՝ 5մգ/կգ՝ առավելագույնը 300 մգ Շաբաթը 2 անգամ՝ 15 մգ/կգ՝ առավելագույնը 900 մգ Երեխաներ՝ Ամեն օր՝10-20 մգ/կգ՝ առավելագույնը 300 մգ Շաբաթը 2 անգամ՝ 20-40 մգ/կգ՝ առավելագույնը 900 մգ
		9 ամիս	Շաբաթը 2 անգամ [†]	52	
			Ամեն օր	270	
			Շաբաթը 2 անգամ [†]	76	

Սովորաբար տրվում է վիտամին B6, սակայն երբեմն տրվում է ավելի ուժեղ դեղամիջոց:

[†]Հավելյալ տեղեկություններ՝ <https://www.cdc.gov/tb/treatment/inactive-tuberculosis.html>



Որո՞նք են գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեմ դեղերի տարածված կողմնակի ազդեցությունները

Բոլոր դեղամիջոցները, նույնիսկ վիտամինները, երբեմն կարող են կողմնակի ազդեցություններ առաջացնել՝ չնայած մարդկանց մեծ մասը դրանք ընդունում է առանց խնդիրներ ունենալու: Ռիֆամպին դեղամիջոցի անվնաս կողմնակի ազդեցությունն այն է, որ այն կարող է ձեր արցունքները, քրտիկները և մեզը դարձնել նարնջագույն-կարմիր: Այս ազդեցությունը նորմալ է և կանհետանա բուժումն ավարտելուց հետո: Սակայն այն կարող է ընդմիջտ ներկել փափուկ կոնտակտայի նոսպյակները (լենզերը): Ուստի ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ձեզ խուսափել բուժման ընթացքում դրանք կրելուց:

Եթե կարծում եք, որ կողմնակի ազդեցություն է առաջացել, անմիջապես զանգահարեք ձեր բժշկին կամ բուժակին: Հնարավոր է, որ նրանք ձեզ ասեն դադարեցնել տուբերկուլոզի դեղերն ընդունելը կամ վերադառնալ կլինիկա՝ նորից հետազոտվելու:

Տարածված կողմնակի ազդեցություններից են՝

- Ցան
- Սրտխառնոց
- Փսխում
- Փորլուծություն
- Հոգնածություն
- Գրիպին բնորոշ աշխատնիշներ
- Գլխապտույտ

Հավելյալ տեղեկություններ՝ <https://www.cdc.gov/tb/webcourses/TB101/page16747.html>

(Armenian)

Մինչև բուժումը սկսելը

- Անապայման բուժակին կամ բժշկին ասեք բոլոր դեղերի անունները, որոնք ընդունում եք: Որոշ դեղեր կարող են խանգարել զաղտնի տուբերկուլոզի բուժմանը, ինչպես նաև կարող են առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, օրինակ՝ սրտխառնոց: Այս տեղեկություններն ասելը օգնում է կանխել խնդիրները և ապահովում է, որ ձեր բուժումը լինի անվտանգ և արդյունավետ:



Եթե դուք օգտագործում եք հակաբեղմնավորիչ հաբեր, խոսեք ձեր բուժակի կամ բժշկի հետ նախքան որևէ նոր դեղ ընդունելը: Որոշ դեղեր կարող են ազդել հակաբեղմնավորիչների արդյունավետության վրա:



Եթե հղի եք, կարծում եք՝ հնարավոր է, որ հղի լինեք, կամ եթե կրծքով կերակրում եք, այդ մասին հայտնեք ձեր բուժակին կամ բժշկին: Սա կօգնի անվտանգ պահել ձեզ և ձեր երեխային:



8. Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժման կարևորությունը՝ ակտիվ տուբերկուլոզ հիվանդությունը կանխելու համար

Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բուժումը կանխում է տուբերկուլոզային հիվանդությունը, քանի որ՝

- Զբոսավելու դեպքում գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ ունեցող 10 մարդուց 1-ը կհիվանդանա ակտիվ տուբերկուլոզով: Ակտիվ տուբերկուլոզը կարող է փոխանցվել այլ մարդկանց և կարող է մահացու լինել:
- Թույլ իմունային համակարգ, շաքարային դիաբետ, քաղցկեղ կամ ՄԻԱՎ ունեցող մարդիկ կարող են ավելի հեշտությամբ հիվանդանալ տուբերկուլոզով: Նրանց օրգանիզմն ավելի դժվար է պայքարում տուբերկուլոզ առաջացնող մանրէների դեմ:
- Ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդացած մարդկանց մեծ մասը դեղորայք չի ընդունել գաղտնի տուբերկուլոզի դեմ: Դեղերը շուտ ընդունելը կարող է օգնել ձեզ հետագայում առողջ մնալ:

9. Ինչո՞ւ է կարևոր ընդունել գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի բոլոր դեղերը

- Գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ ունենալը նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմում կան տուբերկուլոզի մանրէներ, բայց դուք հիվանդ չեք: Եթե ձեր իմունային համակարգը թուլանա, մանրէները կարող են արթնանալ և ձեզ հիվանդացնել: Բոլոր դեղամիջոցներն ընդելը կօգնի կանխել դա:
- Որպեսզի ազատվեք ձեր օրգանիզմում եղած տուբերկուլոզի մանրէներից, ընդունեք գաղտնի տուբերկուլոզի դեմ բոլոր դեղերը:
- Գաղտնի տուբերկուլոզի բուժումն օգնում է, որ այն չվերածվի տուբերկուլոզ հիվանդության: Սա նշանակում է, որ այն չի փոխանցվի այլ մարդկանց:
- Եթե դուք կիսատ թողնեք ձեր դեղերը, տուբերկուլոզի մանրէները կարող են ավելի ուժեղանալ և ավելի դժվարությամբ վերանալ: Սա կոչվում է դեղակայուն տուբերկուլոզ, և այն ավելի դժվար է բուժվում:



Preventing Tuberculosis
Take steps to prevent tuberculosis (TB).



**ԲԱՑ ՄԻ ԹՈՂԵՔ
ՈՐԵՎԷ ԴԵՂԱԶԱՓ:
ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ ՇՈՒՏ ՄԻ
ԿԱՆԳՆԵՑՐԵՔ
ԴԵՂԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ:**

Զավելյալ տեղեկություններ՝ <https://www.cdc.gov/tb/prevention/index.html>

(Armenian)

10. Սնունդ, որը պետք է ուտել, երբ ընդունում եք գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեղեր

Կերեք առողջարար սնունդ, երբ գաղտնի տուբերկուլոզի դեմ դեղեր եք ընդունում: Լավ սնունդը նպաստում է, որ ձեր մարմինն ավելի արագ ապաքինվի և դեղամիջոցն ավելի լավ ազդի:



- **Սպիտակուցներով հարուս սնունդ**
 - Ձուլ
 - Լոբի և ոսպ
 - Ընկուզեղեն և սերմեր
 - Զիչ յուղայնությամբ միս (հնդկահավ, ձուկ, հավ)
- **Սննդանյութերով հարուստ սնունդ**
 - Հատապտուղներ
 - Ցիտրուսային մրգեր
 - Մուգ կանաչ տերևներով բանջարեղեն
- **Բարձր կալորիականություն ունեցող սնունդ**
 - Ավոկադո
 - Պակիր
 - Չգտած կաթ և մածուն
 - Հիր
 - Սև շոկոլադ
 - Գրանոլայի սալիկներ



Խմեք ավելի շատ հեղուկ, օրինակ՝ ջուր կամ կոկոսի հյութ

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնները (CDC) խորհուրդ են տալիս խուսափել ալկոհոլային խմիչքներից, օրինակ՝ գինուց, գարեջրից և լիկյորից, երբ գաղտնի տուբերկուլոզային վարակի դեմ դեղեր եք ընդունում: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե բուժման ընթացքում էլ ինչ կյուրներից կամ գործողություններից պետք է խուսափեք:

11. Ինչպես հոգ տանել ձեր մասին. մարզանք, շնչառություն և ինքնախնամք

Ահա մի քանի խորհուրդ ինքնախնամքի վերաբերյալ, երբ ընդունում եք գաղտնի տուբերկուլոզի դեղեր:

Դեղերն ընդունելու ժամանակացույց

Հետևեք ձեր բուժակի և բժշկի ցուցումներին: Ընդունեք ձեր դեղերն այնպես, ինչպես նրանք ձեզ ասել են՝ դեղաչափերի ճիշտ քանակ և ճիշտ ժամերին:

Ընդունեք ուտելիքի հետ

Եթե ստամոքսի խանգարում եք ունենում, խոսեք ձեր բժշկի հետ: Հնարավոր է, որ նա ձեզ խորհուրդ տա դեղերն ընդունել սննդի հետ:

Հիշեցումներ պատրաստեք

Օգտագործեք զարթուցիչ, դեղահաբերի տուփ կամ նշումներ, որոնք կօգնեն ձեզ հիշել դեղերը պարբերաբար ընդունելը:

Ունեցեք դեղերի ցուցակ

Իմացեք, թե ինչ դեղեր եք ընդունում և ինչու:

Կողմնակի ազդեցություններ

Եթե ունենում եք որևէ կողմնակի ազդեցություն կամ ձեր բուժման վերաբերյալ հարցեր, խնդրում ենք դրանց մասին ասել ձեր բուժակին կամ բժշկին:

Լվացեք ձեր ձեռքերը

Լվացեք ձեռքերը օճառով և ջրով, հատկապես հազալուց, փռշտալուց կամ զուգարանից օգտվելուց հետո:

Բավարար չափով հանգստացեք

Բավարար չափով քունը օգնում է ձեր մարմնին ապաքինվել և ուժեղ մնալ:

Կառավարեք սթրեսը


Կատարեք հանգստացնող վարժություններ, օրինակ՝ խորը շնչել, մեղիտացիա կամ յոգա:

Գնացեք նշանակված հանդիպումներին

Անպայման գնացեք բժշկի հետ բոլոր հանդիպումներին, որպեսզի նրանք տեսնեն, թե ինչպես եք զգում, և օգնեն ձեզ հասնել լավագույն արդյունքի:

12. Տուբերկուլոզով հիվանդների անձնական պատմություններ

Տուբերկուլոզը դեռևս առողջապահական մեծ խնդիր է ԱՄՆ-ում: Այն կարող է պատահել յուրաքանչյուրի հետ՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղից է նա գալիս: Այս պատմություններն այն մասին են, թե ինչ է նշանակում ունենալ գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ կամ ակտիվ տուբերկուլոզ հիվանդություն և թե ինչպես են առողջապահության ոլորտի աշխատողները փորձում կանխել դրանք:



<https://www.cdc.gov/tb/stories/index.html>



Սկանավորեք՝ տեսնելու տուբերկուլոզի մասին անձնական պատմությունները

13. «Մենք ենք տուբերկուլոզը». տուբերկուլոզը հաղթահարածներ և շահերի պաշտպաններ


«Մենք ենք տուբերկուլոզը» (We are TB) աջակցության և շահերի պաշտպանության համագգային կազմակերպություն է, որը ղեկավարում են անձամբ տուբերկուլոզ ունեցած մարդիկ: Նրանց առաքելությունն է ուժ տալ, կրթել տուբերկուլոզից տուժած մարդկանց ու կապեր ստեղծել նրանց համար՝ համագործակցելով կլինիկաների և բժշկական ծառայությունների մատակարարների հետ, որպեսզի բարելավեն բոլորի բուժումը, աջակցությունը և արդյունքները: Նրանք օգնում են հիվանդներին և բժիշկներին՝ պատմելով հիվանդների պատմությունները, որպեսզի օգնեն մյուսներին հասկանալ տուբերկուլոզը և իրենց շատ միայնակ չգալ:



<https://www.wearetb.com>



Սկանավորեք՝ տեսնելու «Մենք ենք տուբերկուլոզը» (We are TB)



«Տուբերկուլոզի հարցերով Ամերիկայի ազգային» միության (NTCA) առաքելությունը

«Պահպանել հանրության առողջությունը՝ նպաստելով ԱՄՆ-ում տուբերկուլոզի վերացմանը նահանգային, տեղական և տարածքային ծրագրերի համակարգված գործողությունների միջոցով»:

<https://www.tbcontrollers.org>
(Armenian)



Սկանավորեք՝ NTCA-ի կայքի համար


Հաճախակի տրվող հարցեր

1. Կա՞րողո՞ք ակտիվ տուբերկուլոզի դեմ պատվաստանյութ:

- Կալմետ-Գերինի բացիլը՝ ԲՑԺ-ն (անգլերեն՝ Bacille Calmette-Guérin (BCG)) ակտիվ տուբերկուլոզ հիվանդության դեմ պատվաստանյութ է, որը հաճախ տրվում է մարդկանց այլ երկրներում՝ ոչ ԱՄՆ-ում:
- Այս պատվաստանյութը լայնորեն չի օգտագործվում Միացյալ Նահանգներում հետևյալի պատճառներով.
 - Տուբերկուլոզի մանրէներով վարակվելու վտանգը ցածր է Միացյալ Նահանգներում:
 - Պատվաստանյութի արդյունավետությունը մեծահասակների թոքային տուբերկուլոզի (թոքախտի) դեմ փոփոխական է: Դուք կարող եք դարձյալ ձեռք բերել գաղտնի և ակտիվ տուբերկուլոզ, նույնիսկ եթե նախկինում պատվաստվել եք ԲՑԺ (BCG) պատվաստանյութով:
 - Պատվաստանյութի պատճառով տուբերկուլոզի մաշկային թեստի պատասխանը կարող է դրական լինել, նույնիսկ եթե դուք չունեք տուբերկուլոզ:
- Եթե տուբերկուլոզի դեմ պատվաստվել եք, այդ մասին ասեք ձեր բուժակին կամ բժշկին:

2. Արդյո՞ք Կալմետ-Գերինի բացիլի՝ ԲՑԺ (BCG) պատվաստանյութն ինձ ամբողջությամբ պաշտպանում է ակտիվ տուբերկուլոզից:

- ԲՑԺ (BCG) պատվաստանյութը չի պաշտպանում մարդկանց թոքերի ակտիվ տուբերկուլոզով (թոքախտ) հիվանդանալուց, որը հիվանդության ամենատարածված ձևն է Միացյալ Նահանգներում:



Tuberculosis Vaccine

Bacille Calmette-Guérin (BCG) is a vaccine for TB disease. It is not generally used in the U.S.

■ Tuberculosis (TB) / Feb 5

<https://www.cdc.gov/tb/vaccines/index.html>

3. Արդյո՞ք ես պետք է մեկուսանամ, եթե ունեմ գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ

Ոչ, գաղտնի տուբերկուլոզային վարակ ունեցող մարդիկ կարիք չունեն հեռու մնալու ուրիշներից: Նրանք վարակող չեն և չեն կարող տարածել տուբերկուլոզի մանրէներ: Նրանք կարող են դպրոց գնալ, աշխատել և ճամփորդել սովորականի պես: Միայն **ակտիվ** տուբերկուլոզով հիվանդ մարդիկ կարող են փոխանցել մանրէները ուրիշներին:

Հանրային Առողջության՝ տուբերկուլոզի բուժականների կլինիկայի տվյալներ

Հանրային Առողջության Ձեր բուժակի անունը՝

Հանրային Առողջության Ձեր կլինիկան՝

Տուբերկուլոզի կլինիկայի հեռախոսահամարը՝

County of Los Angeles Public Health DPH Public Health Centers
Nurse Only Clinic Registration Schedule

All children are subject to change and clinics are closed during an outbreak. The following schedule reflects registration hours and clinics open 30 minutes after registration begins. Please call ahead to confirm visit hours and to schedule an appointment. Please arrive 15 minutes prior to your appointment.

limited with in appointments are available on the same day. In patients should arrive as early as possible to improve the likelihood of being seen.

Nurse Only Clinic services:

- All childhood immunizations and TB testing
- Adult immunizations for those unvaccinated and underinsured
- TB testing for those in congregate living, school volunteers as well as uninsured and underinsured
- COVID-19 diagnosis and testing for all ages
- Flu vaccines
- Hepatitis vaccines

There is a \$15 vaccine administration fee per patient for each visit to our Nurse Only Clinic and \$20.00 for families of two or more. This fee covers all services for that visit. If the child has Medi-Cal or Medicare plan, this cost is free if the patient can provide the Medi-Cal coverage card at the time of registration.

Antelope Valley Health Center	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY
AMF	No Clinic	7:30-11:00	7:30-11:00	8:30-1:00	7:30-11:00
PMF	No Clinic	1:30-5:00	7:30-11:00	7:30-11:00	No Clinic

Address: 155-6501 FERNLEIGH RD
LANCASTER, CA 93535
Business Office (818) 475-4602
(Between Division Street & Brighton Avenue)

Pasadena Health Center	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY
AMF	No Clinic	No Clinic	No Clinic	No Clinic	7:30-11:00
PMF	No Clinic	No Clinic	No Clinic	No Clinic	No Clinic

Address: 11000 North Hollywood Blvd
Pasadena, CA 91105
Business Office (626) 441-5800
This clinic is only open on the first Friday of each month.

San Gabriel Valley PHA 3	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY
AMF	7:30-11:00	7:30-11:00	No Clinic	No Clinic	7:30-11:00
PMF	No Clinic	7:30-11:00	No Clinic	7:30-11:00	No Clinic


Address: 11000 North Hollywood Blvd
Pasadena, CA 91105
Business Office (626) 441-5800

Տուբերկուլոզի բուժականների կլինիկայի ժամակացույցի pdf-ը



Տուբերկուլոզի բուժականների կլինիկայի ամենանոր և ընթացիկ ժամակացույցը pdf տարբերակով տեսնելու համար սեղմեք հղումը կամ սկանավորեք QR կոդը՝

<http://ph.lacounty.gov/tb/docs/nurseclinic.pdf>



Questions and Answers About Tuberculosis Booklet

Questions and Answers About TB has information on inactive TB and TB disease.

cdc.gov



Treating Tuberculosis

Both inactive tuberculosis (TB) and active TB disease can be treated.

 Tuberculosis (TB) / Apr 17

<https://www.cdc.gov/tb/communication-resources/tb-questions-and-answers-booklet.html>



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health