


عفونت

سل

نهفته (LTBI) چیست؟

کتابچه آموزش بیمار



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health



Farsi

فهرست مطالب


- 5 1. عفونت سل نهفته (LTBI) چیست؟
- 5 2. تفاوت عفونت سل نهفته با بیماری سل (TB) چیست؟
- 6 3. میکروب‌های سل چگونه وارد بدن می‌شوند؟
- 6 4. چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به عفونت سل نهفته قرار دارند؟
- 7 5. نحوه تشخیص عفونت سل نهفته
- 8 6. درمان عفونت سل نهفته
- 11-9 7. چه مدتی باید داروهای عفونت سل نهفته را مصرف کنم؟
- 12 8. اهمیت درمان عفونت سل نهفته برای پیشگیری از بیماری سل فعال
- 12 9. چرا مهم است که همه داروهای عفونت سل نهفته خود را به‌طور کامل مصرف کنید
- 13 10. غذاهایی که باید هنگام مصرف داروهای عفونت سل نهفته بخورید
- 14 11. مراقبت از خود: ورزش، تنفس و خود مراقبتی
- 15 12. گفته‌های بیماران
- 15 13. We are TB: بازماندگان و حامیان سل
- 16 سوالات متداول
- 17 اطلاعات کلینیک سل بهداشت عمومی




1. عفونت سل نهفته (LTBI) چیست؟

- افراد مبتلا به عفونت سل، میکروب سل را در بدن خود دارند، اما دچار بیماری سل نیستند. کلمه «نهفته» به عفونت سل «غیرفعال» اشاره دارد.
- این میکروب‌ها می‌توانند در بدن شما پنهان شده و «خواب» بمانند و در نتیجه شما احساس بیماری نکرده و آن‌ها را به دیگران منتقل نمی‌کنید. اما اگر بدن‌تان ضعیف‌تر شود، این میکروب‌ها «بیدار» شده و فعال می‌شوند و باعث بیمار شدن شما می‌شوند. این بیماری سل (TB) است. هر کسی می‌تواند میکروب نهفته سل را بگیرد.
- درمان افراد مبتلا به سل غیرفعال کمک می‌کند که بعداً به بیماری سل دچار نشوند.

2. تفاوت عفونت سل نهفته با بیماری سل (TB) چیست؟



چه تفاوتی میان عفونت سل نهفته (TB) و بیماری سل (TB) وجود دارد؟	
فرد مبتلا به بیماری سل:	فرد مبتلا به عفونت سل نهفته:
علامت بیماری را دارد	هیچ علامتی ندارد
احساس بیمار بودن می‌کند	احساس بیماری نمی‌کند
می‌تواند میکروب‌های سل را به دیگران منتقل کند	نمی‌تواند میکروب‌های سل را به دیگران منتقل کند
درمان می‌تواند بیماری سل را متوقف کند	درمان می‌تواند مانع از بروز بیماری سل شود



3. میکروب‌های سل چگونه وارد بدن می‌شوند؟

وقتی فرد بیمار در اتاق بدون هوای تازه سرفه می‌کند، عطسه می‌کند، صحبت می‌کند یا آواز می‌خواند، میکروب‌های سل می‌توانند از طریق هوا منتشر شوند.

اگر شما از آن هوا تنفس کنید، میکروب‌ها ممکن است وارد بدن‌تان شوند.

در ابتدا، میکروب سل می‌تواند در بدن شما در حالت خواب باقی بماند. به این حالت «عفونت سل نهفته» می‌گویند، که باعث بیماری شدن شما نمی‌شود و به دیگران هم سرایت نمی‌کند. اما اگر بدن شما ضعیف شود و نتواند به خوبی با میکروب‌ها مبارزه کند، میکروب سل می‌تواند «بیدار» شود و شما را بیمار کند. به این حالت بیماری سل فعال می‌گویند.

4. چه کسی شانس بیشتری برای ابتلا به بیماری سل نهفته (LTBI) دارد؟

هر کسی می‌تواند میکروب نهفته سل را بگیرد. اما اگر عوامل خطر زیر را داشته باشید احتمال ابتلای شما بیشتر می‌شود:

تولد، سفر یا زندگی (بیشتر از 1 ماه) در کشوری با نرخ بالای ابتلا به سل



در حال آماده شدن برای یا در حال مصرف داروهای باشیدا که میزان محافظت از بدن شما در برابر عفونت‌ها را کاهش می‌دهند، مانند درمان سرطان



داشتن تماس نزدیک با فرد مبتلا به بیماری سل مسری در طول زندگی



بی‌خانمانی یا حبس در گذشته یا حال



برای کسب اطلاعات بیشتر:

https://www.cdc.gov/tb/media/Question_Answers_About_TB_English.pdf

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/TB-Risk-Assessment.aspx>

5. نحوه تشخیص عفونت سل نهفته

انجام آزمایش برای تشخیص عفونت سل نهفته به افراد کمک می‌کند تا سالم بمانند، به ویژه اگر در اطراف فرد مبتلا به سل فعال باشند یا بوده باشند. بعضی از افراد تنها یک بار نیاز به آزمایش دارند، اما کسانی که در موقعیت‌های پرخطر کار می‌کنند، دچار برخی بیماری هستند، علائم دارند یا در معرض فرد مبتلا به سل فعال قرار گرفته‌اند، ممکن است هر سال نیاز به آزمایش داشته باشند.

دو نوع آزمایش می‌تواند نشان دهد که فرد به میکروب سل آلوده شده است:



آزمایش خون TB



آزمایش پوستی TB

برای کسب اطلاعات بیشتر:

https://www.cdc.gov/tb/testing/blood-test.html#cdc_testing_how_to_get_tested-how-to-get-tested

6. درمان عفونت سل نهفته

چرا باید درمان شوم؟

زمانی که باکتری‌های سل وارد بدن شما می‌شوند، ممکن است این باکتری‌ها (میکروب‌ها) در حالت غیرفعال باقی بمانند که تحت عنوان عفونت سل نهفته شناخته می‌شود. در این مرحله، احساس بیمار بودن نمی‌کنید، علائمی ندارید و آن را به دیگران منتقل نمی‌کنید. اما اگر سیستم ایمنی شما ضعیف شود، این باکتری‌ها می‌توانند فعال شده و منجر به بروز بیماری سل و در نتیجه بیمار شدن شما شوند.

مصرف دارو برای عفونت سل نهفته کمک می‌کند تا میکروب‌های سل کشته شوند و در نتیجه «بیدار» نشوند و شما را بیمار نکنند. این داروها شما را سالم نگه می‌دارند و در محافظت از خانواده و دوستانتان نیز موثر هستند.



برای کسب اطلاعات بیشتر:

https://www.cdc.gov/tb/media/Question_Answers_About_TB_English.pdf

7. چه مدتی باید داروهای عفونت سل نهفته را مصرف کنم؟

اگر کسی به عفونت سل نهفته مبتلا شود باید دارو مصرف کند تا بدنش سالم بماند. بیشتر افراد به مدت 3 تا 4 ماه دارو مصرف می‌کنند. اما گاهی این دوره بسته به نوع تماس با سل فعال، وضعیت پزشکی شما و توصیه‌های پزشک 3 تا 9 ماه طول می‌کشد. نمونه‌هایی از درمان عفونت سل نهفته عبارتند از:

برنامه‌های درمانی مخصوص درمان عفونت سل فعال

داروی	مدت زمان	فرمانی	مجموع نوزها	نوز و گروه سنی
ایزونیازید ¹ ریفامپین ¹¹ (3HP)	3 ماه	یک بار در هفته	12	بزرگسالان و فرزندان 12 سال INH: 15 میلی‌گرم/کیلوگرم فرد شده به نزدیکترین 50 یا 100 میلی‌گرم؛ حداکثر 900 میلی‌گرم RPT: 10-14.0 کیلوگرم: 300 میلی‌گرم 14.1-25.0 کیلوگرم: 450 میلی‌گرم 25.1-32.0 کیلوگرم: 600 میلی‌گرم 32.1-49.9 کیلوگرم: 750 میلی‌گرم 250.0 کیلوگرم: حداکثر 900 میلی‌گرم
	4 ماه	روزانه	120	فرزندان 11-2 سال INH: 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 900 میلی‌گرم RPT: 10-14.0 کیلوگرم: 300 میلی‌گرم 14.1-25.0 کیلوگرم: 450 میلی‌گرم 25.1-32.0 کیلوگرم: 600 میلی‌گرم 32.1-49.9 کیلوگرم: 750 میلی‌گرم 250.0 کیلوگرم: حداکثر 900 میلی‌گرم
ریفامپین ⁶ (4R)	3 ماه	روزانه	90	بزرگسالان INH: 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 300 میلی‌گرم ریفامپین: 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 600 میلی‌گرم فرزندان INH: 20-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 300 میلی‌گرم ریفامپین: 20-15 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 600 میلی‌گرم
ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید، تری‌پارامید (6H/9H)	6 ماه	روزانه	180	بزرگسالان
	9 ماه	دو بار در هفته*	52	روزانه: 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 300 میلی‌گرم دو بار در هفته: 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 900 میلی‌گرم
	9 ماه	روزانه	270	فرزندان
		دو بار در هفته*	76	روزانه: 20-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 300 میلی‌گرم دو بار در هفته: 20-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، حداکثر 900 میلی‌گرم

معمولاً ویتامین B6 تجویز می‌شود و در برخی موارد نادر هم داروهای قوی‌تر دیگری تجویز می‌شوند.



داروهای مورد استفاده برای درمان عفونت سل نهفته چه عوارض جانبی شایعی دارند؟

همه داروها، حتی ویتامین‌ها هم گاهی می‌توانند عوارض جانبی داشته باشند، هرچند بیشتر افراد بدون تجربه هیچ مشکلی آن‌ها را مصرف می‌کنند. یکی از عوارض بی‌خطر داروی ریفامپین تغییر رنگ اشک، عرق و ادرار به رنگ نارنجی-قرمز است. این اثر طبیعی است و پس از پایان درمان برطرف می‌شود. با این حال، می‌تواند لکه‌های دائمی روی لنزهای نرم تماسی ایجاد کند، به همین دلیل ممکن است ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما به شما توصیه کند هنگام درمان از لنز استفاده نکنید.

اگر فکر می‌کنید دچار عارضه‌ای شده‌اید، فوراً با پزشک یا پرستار خود تماس بگیرید. آن‌ها ممکن است از شما بخواهند مصرف داروهای سل فعال را متوقف کنید یا برای انجام آزمایش‌های بعدی در مطب حضور پیدا کنید.

- بثورات پوستی
- حالت تهوع
- استفراغ
- اسهال
- خستگی
- علائم شبه آنفلوآنزا
- سرگیجه یا سبکی سر

برای کسب اطلاعات بیشتر:

10 <https://www.cdc.gov/tb/webcourses/TB101/page16747.html>

قبل از شروع درمان:

- حتماً پرستار یا پزشک خود را از همه داروهایی که مصرف می‌کنید، مطلع نمایید. برخی داروها می‌توانند در درمان عفونت سل نهفته اختلال ایجاد کرده و عوارض جانبی نظیر تهوع را به همراه داشته باشند. به اشتراک گذاری اطلاعات به پیشگیری از بروز مشکلات کمک کرده و ایمن و موثر بودن درمان شما را تضمین می‌کند.

اگر از قرص‌های
جلوگیری از بارداری
استفاده می‌کنید، پیش از
مصرف هر داروی جدید
با پزشک مشورت کنید.



اگر باردار هستید، احتمال
می‌دهید باردار باشید یا
شیردهی دارید، به پرستار
یا پزشک خود اطلاع
دهید. این کار به ایمن نگه
داشتن شما و نوزادتان
کمک می‌کند.



8. اهمیت درمان عفونت سل نهفته برای پیشگیری از بیماری سل فعال

درمان عفونت سل نهفته از بیماری سل جلوگیری می‌کند زیرا:

- اگر درمان نشود، 1 نفر از هر 10 فرد مبتلا به عفونت سل نهفته دچار بیماری سل فعال خواهد شد. بیماری سل فعال قابل سرایت به اشخاص دیگر است و می‌تواند کشنده باشد.
- افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا بیماران مبتلا به دیابت، سرطان یا HIV راحت‌تر با سل دچار بیماری می‌شوند. برای بدن‌های این افراد مبارزه با میکروب‌های عامل بروز بیماری سل مشکل‌تر است.
- بیشتر کسانی که به بیماری سل فعال مبتلا می‌شوند، داروی عفونت سل نهفته مصرف نکرده‌اند. دریافت زودهنگام دارو به سالم ماندن شما در آینده کمک می‌کند.

9. چرا مهم است که همه داروهای عفونت سل نهفته

خود را به‌طور کامل مصرف کنید

- عفونت سل نهفته به معنای وجود میکروب سل در بدن شماست، اما احساس بیماری نمی‌کنید. اگر سیستم ایمنی بدن‌تان ضعیف شود، این میکروب‌ها می‌توانند بیدار شده و باعث بیمار شدن‌تان شوند. مصرف همه داروهای‌تان در جلوگیری از وضعیت موثر است.
- برای این که همه میکروب‌های سل را بدن‌تان نابود کنید، همه داروهای سل نهفته خود را مصرف کنید.
- درمان سل نهفته کمک می‌کند که به بیماری سل فعال تبدیل نشود. یعنی به افراد دیگر سرایت نخواهد کرد.
- اگر داروهای سل خود را به‌طور کامل مصرف نکنید، میکروب‌ها قوی‌تر می‌شوند و کشتن آن‌ها سخت‌تر می‌شود. به این حالت، سل مقاوم به دارو گفته می‌شود که درمان آن دشوارتر است.

هیچ دوزی را فراموش نکنید.
مصرف داروها را زودتر
متوقف نکنید!



Preventing Tuberculosis
Take steps to prevent tuberculosis (TB).
Tuberculosis (TB) / Apr 17

برای کسب اطلاعات بیشتر:

<https://www.cdc.gov/tb/prevention/index.html>

10. غذاهایی که باید هنگام مصرف داروهای عفونت سل نهفته بخورید:

در طول مصرف داروهای سل نهفته خود، تغذیه سالم داشته باشید. داشتن رژیم غذایی مناسب به بهبود سریع‌تر بدن شما و اثربخشی بیشتر داروها کمک می‌کند.

• غذاهای سرشار از پروتئین:

- تخم مرغ
- لوبیا و عدس
- مغزها و دانه‌ها
- گوشت بدون چربی (مرغ، ماهی، بوقلمون)

• غذاهای غنی از مواد مغذی:

- توت‌ها
- مرکبات
- سبزیجات دارای برگ سبز تیره

• غذاهای پرکالری:

- آووکادو
- پنیر
- شیر و ماست پرچرب
- میوه خشک‌شده
- شکلات تلخ
- گرانولا



👉 مصرف مایعات مثل آب و آب نارگیل را افزایش دهید

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) توصیه می‌کند هنگام مصرف دارو برای درمان عفونت نهفته سل، از نوشیدنی‌های الکلی مانند شراب، آبجو و مشروبات الکلی اجتناب کنید. در مورد هرگونه مواد یا فعالیت‌های دیگری که باید در حین درمان از آن‌ها اجتناب کنید، با پزشک خود مشورت نمایید.



Treating Inactive Tuberculosis

Treating inactive tuberculosis is the best way to prevent active TB disease.

Tuberculosis (TB) / Apr 17

برای کسب اطلاعات بیشتر: <https://www.cdc.gov/tb/treatment/inactive-tuberculosis.html>

11. مراقبت از خود: ورزش، تنفس و خود مراقبتی

نکاتی برای مراقبت از خود در حین مصرف داروهای سل نهفته:

برنامه زمانی مصرف داروها

دستورات پزشک یا پرستار را بهدقت رعایت کنید. داروهای خود را دقیقاً طبق دستور پزشک و با دوز صحیح و در زمان درست مصرف کنید.

همراه غذا مصرف کنید:

اگر معده‌تان انزیم می‌شود، با پزشک خود در میان بگذارید. ممکن است به شما بگویند که داروی خود را همراه با غذا مصرف نمایید.

یادآوری تنظیم کنید:

از زنگ هشدار، جعبه قرص یا یادداشت نوشتن استفاده کنید تا به یاد داشته باشید که داروهای خود را به موقع مصرف کنید.

فهرستی از داروها تهیه کنید:

بدانید چه داروهایی مصرف می‌کنید و چرا.

عوارض جانبی:

اگر دچار هرگونه عارضه جانبی شدید یا سوالی درباره درمان‌تان داشتید، لطفاً به پرستار یا ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود اطلاع دهید.

دست‌های خود را بشویید:

دست‌های خود را با آب و صابون بشویید، مخصوصاً بعد از سرفه، عطسه یا استفاده از سرویس بهداشتی.

به اندازه کافی استراحت کنید:

خواب کافی به بدن کمک می‌کند تا بهبود یابد و قوی بماند.

مدیریت استرس:

فعالیت‌های آرام‌بخش مثل تنفس عمیق، مدیتیشن یا یوگا را تمرین کنید.

حضور در قرارهای ملاقات:

حتماً در همه ویزیت‌های پزشکی خود شرکت کنید تا وضعیت شما بررسی شده و بهبودی کامل تضمین شود.

12. داستان‌های شخصی بیماران مبتلا به سل

سل هنوز یک مشکل بهداشتی قابل توجه در ایالات متحده است. این بیماری می‌تواند برای هر کسی صرف نظر از اینکه از کجا آمده، رخ دهد. این داستان‌ها نشان می‌دهند که تجربه ابتلا به سل نهفته یا سل فعال چگونه است و کارکنان بهداشت چگونه تلاش می‌کنند تا آن را متوقف کنند.



برای مشاهده داستان‌های
شخصی سل اینجا را اسکن
کنید



<https://www.cdc.gov/tb/stories/index.html>

13. We are TB: بازماندگان و حامیان سل

We Are TB (ما سل هستیم) یک شبکه ملی حمایت و دفاع است که توسط افرادی اداره می‌شود که خودشان شخصاً تجربه بیماری سل را داشته‌اند. مأموریت آن‌ها عبارت است از توانمندسازی، آموزش و اتصال افراد تحت آسیب دیده از سل و با کلینیک‌ها و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در راستای تامین مراقبت، حمایت و نتایج بهتری برای همه، همکاری می‌کنند. این نهاد با به اشتراک گذاشتن داستان‌های بیماران، به بیماران و پزشکان کمک می‌کند تا به دیگران کمک کنند دیگران سل را بهتر درک کرده و کمتر احساس تنهایی کنند.




برای مشاهده صفحه وب
We are TB اینجا را اسکن
کنید



<https://www.wearetb.com>



مشاهده صفحه وب NTCA اینجا
را اسکن کنید



مأموریت NTCA

«حفاظت از سلامت عمومی از طریق پیشبرد ریشه‌کنی سل در ایالات متحده با اجرای هماهنگ برنامه‌های ایالتی، محلی و سرزمینی».

<https://www.tbcontrollers.org>

1. آیا واکسنی برای سل فعال وجود دارد؟

- واکسن باسیل کالمت-گورین (BCG) مخصوص پیشگیری از بیماری سل فعال (TB) است که اغلب به بسیاری از افراد در خارج از ایالات متحده ارائه می‌شود.
- از این واکسن معمولاً به این دلایل در ایالات متحده استفاده نمی‌شود:
 - خطر پایین ابتلا به باکتری سل در ایالات متحده
 - اثربخشی متفاوت واکسن در مقابل سل ریوی بزرگسالان. حتی اگر قبلاً هم واکسن BCG را دریافت کرده باشید باز هم ممکن است مبتلا به سل غیرفعال و فعال شوید
 - و این واکسن می‌تواند باعث مثبت شدن آزمایش سل پوستی شود، حتی اگر به سل مبتلا نباشید.
- اگر واکسن سل را دریافت کرده‌اید به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید.

2. آیا واکسن باسیل کالمت-گورین (BCG) از من به‌طور کامل در برابر ابتلا به سل فعال محافظت می‌کند؟

- واکسن سل BCG از افراد در برابر ابتلا به بیماری سل فعال در ریه‌ها که رایج‌ترین شکل این بیماری در ایالات متحده است، محافظت نمی‌کند.



Tuberculosis Vaccine

Bacille Calmette-Guérin (BCG) is a vaccine for TB disease. It is not generally used in the U.S.

Tuberculosis (TB) / Feb 5

<https://www.cdc.gov/tb/vaccines/index.html>

واکسن BCG یک واکسن تزریقی است که به محافظت افراد در برابر سل کمک می‌کند، اما این تزریق برای همه به یک شکل موثر نیست. گاهی این واکسن به خوبی عمل می‌کند و گاهی هم تأثیر چندانی ندارد. یعنی حتی اگر فردی واکسن BCG را هم دریافت کند، ممکن است بعدها به سل مبتلا شود.

3. آیا در صورت ابتلا به عفونت سل نهفته نیاز به قرنطینه دارم؟

خیر، افراد مبتلا به عفونت سل نهفته نیازی به فاصله گرفتن از دیگران ندارند. این افراد بیماری مسری ندارند و نمی‌توانند میکروب سل را منتقل کنند. آن‌ها می‌توانند مثل همیشه به مدرسه، محل کار و سفر بروند. فقط افراد مبتلا به بیماری سل فعال می‌توانند میکروب‌ها را به دیگران منتقل کنند.

پرستار بهداشت عمومی شما:

کلینیک TB شما:

شماره تلفن کلینیک TB:



DPH Public Health Centers

Nurse Only Clinic Registration Schedule



As providers of substance use treatment and clinics are closed during [this time](https://www.mass.gov/info-details/covid-19-restriction), the following information reflects registration hours and clinic days. 30-minute office registration hours are posted and allowed to continue and have not changed in this appointment. Please use this information to properly plan your appointment.

Limited with no appointments are available on the same day. Walk in patients should arrive as early as possible to improve the likelihood of seeing a provider.

Nurse Only Clinic provides:

- All alcohol immunizations and drug testing
- All immunizations for children and unvaccinated
- IV testing for those in treatment, blood, urine, and saliva in an untreated and unvaccinated
- COVID-19 testing and testing for all age groups
- Referrals
- Minor injuries

There is a \$25.00 administration fee per patient for each visit to our Nurse Only Clinic and \$200.00 for families of three or more. The fee covers all services for that visit. If the Adult has Mail-Oral or Telephone care, this cost is waived if the patient can provide the Mail-Oral coverage and all the other services of registration.

Registration Hours	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Adult	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Family	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Adolescent	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00

Address: 225 HIGHLAND AVE
ROCKFORD, MASS 01866

Business Office: 978-681-4754
Benson Center Branch (Benson/Cohasset)

Provision Health Center

Registration Hours	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Adult	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Family	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Adolescent	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00

Address: 1220 Highland Ave
ROCKFORD, MASS 01866

Business Office: 978-681-4662

Provision Health Center

Registration Hours	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Adult	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Family	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Adolescent	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00

Address: 1220 Highland Ave
ROCKFORD, MASS 01866

Business Office: 978-681-4662

Provision Health Center

Registration Hours	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Adult	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Family	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00
Adolescent	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00	9:00-12:00

Address: 1220 Highland Ave
ROCKFORD, MASS 01866

Business Office: 978-681-4662

برای دسترسی به جدیدترین و بهروزترین فایل TB Nurse Clinic Schedule.pdf، به لینک زیر مراجعه کنید یا QR را اسکن نمایید.


<http://ph.lacounty.gov/tb/docs/nurseclinic.pdf>



Questions and Answers About Tuberculosis Booklet

Questions and Answers About TB has information on inactive TB and TB disease.

cdc.gov



Treating Tuberculosis

Both inactive tuberculosis (TB) and active TB disease can be treated.

 Tuberculosis (TB) / Apr 17

<https://www.cdc.gov/tb/communication-resources/tb-questions-and-answers-booklet.html>



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

