

ОСПА ОБЕЗЬЯН: ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ

Оспа обезьян является инфекционным заболеванием, вызываемым одноименным вирусом. Любой человек, который находился в тесном личном контакте с заболевшим оспой обезьян, попадает в группу риска.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ОСПА ОБЕЗЬЯН?

Известно, что оспа обезьян распространяется при тесном, интимном и/или длительном контакте, включая:

- прямой контакт «кожа к коже» с сыпью, корками или биологическими жидкостями человека, зараженного вирусом оспы обезьян;
- контакт с предметами и тканями, которые использовались человеком, зараженным вирусом оспы обезьян;
- контакт с выделениями из дыхательных путей человека, зараженного вирусом оспы обезьян.

Заразиться вирусом оспы обезьян можно в результате:

- полового и прочего интимного контакта, включая поцелуи, массаж, объятия;
- совместного использования тканей и предметов (таких как одежда, постельное белье, полотенца, секс-игрушки), которые не подвергались стирке/чистке;
- длительного, тесного контакта лицом к лицу, например продолжительного разговора лицом к лицу (около трех часов или более);
- проживания в одном доме с зараженным человеком, совместного пользования постелью или ухода за человеком, зараженным вирусом оспы обезьян.

Заболевший оспой обезьян может передавать вирус другим людям с момента появления симптомов до тех пор, пока сыпь не заживет, не отпадут корки и не образуется новый слой кожи. Обычно это занимает от 2 до 4 недель.

У беременных людей, заболевших оспой обезьян, вирус может передаваться плоду через плаценту.

Оспа обезьян НЕ передается при кратковременной беседе или при ходьбе рядом с заболевшим человеком.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН?

ОСНОВНОЙ СИМПТОМ

СЫПЬ



Сыпь может:

- выглядеть как бугорки, прыщи, пузыри, язвы или корочки;
- находиться на любом участке тела, включая половые органы, анус, рот, кисти рук, лицо;
- ограничиваться одной областью или распространяться по всему телу;
- сопровождаться зудом или болью (особенно при локализации во рту или в анусе).

ДРУГИЕ СИМПТОМЫ

ГРИППОПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ



Лихорадка/
озноб



Сильная
утомляемость,
боли в мышцах,
головная боль



Припухлость
лимфатичес-
ких узлов

- Гриппоподобные симптомы могут развиваться за 1-4 дня до появления сыпи или после ее появления.
- Эти симптомы характерны не для всех заболевших оспой обезьян.


Симптомы обычно появляются через 5-21 день после воздействия вируса

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ

Если вы обнаружили недавно возникшие высыпания необъяснимой природы или другие очаги поражения на любой части тела. Крайне важно это сделать, если вы контактировали с человеком, заболевшим оспой обезьян, или с человеком, у которого подозревают это заболевание.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРАЧА

- Позвоните в колл-центр Службы общественного здравоохранения (Public Health Call Center) по номеру 1-833-540-0473 (8:00–20:30 ежедневно).
- Обратитесь в ближайшую [Клинику сексуального здоровья Службы общественного здравоохранения](#).



Чтобы найти
адрес клиники,
отсканируйте
QR-код

Для получения дополнительной информации по оспе обезьян посетите веб-сайт:
ph.lacounty.gov/Monkeypox 26.08.2022



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health