


¿Qué son Gonorrea y Clamidia?



Recientemente, su pareja sexual recibió tratamiento para la gonorrea y/o la clamidia. Para proteger su salud, usted necesita recibir tratamiento.

Gonorrea [go-no-rey-a] y clamidia [kla-mi-di-a] son enfermedades transmitidas sexualmente (ETS) que se puede contraer al tener sexo vaginal, anal u oral. Porque su pareja está infectado/a, la posibilidad de que usted esté infectado/a también es grande. Muchas personas que tienen una ETS no tienen síntomas. Esto quiere decir que alguien puede estar infectado/a aunque se sienta bien.

Es muy importante que usted reciba tratamiento ahora mismo. Si no recibe tratamiento a tiempo, gonorrea y clamidia se pueden extender y causar problemas serios en el cuerpo.

¡Lo bueno es que gonorrea y clamidia tienen cura! **La mejor manera de cuidarse es de ir a un doctor inmediatamente.** Si usted no puede ver a un doctor dentro de una semana de recibir este folleto, puede tomar medicinas recetadas por un doctor.

Tratamiento para Gonorrea y Clamidia

El Tratamiento para chlamydia consiste de antibióticos:

Azithromycin/Zithromax: (1000 mg)
(Tome todas(4) pastillas de (250mg)en una dosis)

El Tratamiento para gonorrea consiste de antibióticos:

Cefpodoxime/Vantin 2 pastillas (400mg)
(Tome todas(2) pastillas de(200 mg)en una dosis)

O

Cefixime/Suprax (400 mg)
(Tome 1 pastilla de (400 mg) o 2 pastillas de (200mg) en una dosis)

A menos que se haga un examen primero, no hay otra manera de saber con seguridad si usted tiene gonorrea, clamidia, o las dos. Esto quiere decir que usted necesita tomar las dos medicinas, aunque su pareja recibió otro tratamiento.

Estas dos medicinas solamente curan gonorrea y clamidia. Por eso, es importante hacerse un examen para otras ETS lo más pronto posible. Tener gonorrea o clamidia puede aumentar su riesgo de contraer el VIH. Usted debería asegurarse que una prueba para el VIH esté incluido como parte de su examen para ETS.

Avisos Importantes

Para muchas personas, tomar las pastillas sin ver a un doctor es seguro.

NO tome estas medicinas si:

- Mujeres: tiene dolor en el abdomen inferior, dolor con relaciones sexuales, vómitos, o fiebre
- Hombres: dolor o hinchazón de los testículos o fiebre
- Tiene dolor en las coyunturas o salpullido en el cuerpo
- Tiene enfermedad de los riñones, del corazón o del hígado
- Ha tenido una mala reacción después de tomar antibióticos

Si cualquiera de estas frases son ciertas, o si no está seguro/a, todavía necesita recibir tratamiento. Vaya a un doctor inmediatamente.

Si no tiene doctor vaya a las Clínicas de ETS del Condado de Los Angeles ellos ofrecen exámenes y tratamiento gratis y confidenciales. Llame a la línea de ETS al 1-800-758-0880, visite www.lapublichealth.org/std



NO tome estas pastillas si ha tenido una mala reacción, salpullido, problemas con respirar, or una reacción alérgica después de tomar antibióticos. Personas que tienen alergias a algunos antibióticos pueden tener alergias a otros. Si tiene alergias a antibióticos, hable con su doctor antes.

ALTO. No tome estas pastillas si ha tenido una mala reacción a los antibióticos. Lea "Avisos Importantes."

Tome todas las pastillas juntas, con agua.
Para curarse, hay que tomar todas las pastillas.

- Tome las pastillas con comida para evitar náusea.
- NO TOME antiácidos (como Tums, Roloids, o Maalox) 1 hora antes o 2 horas después de tomar las pastillas. Pueden causar que la medicina no funcione.
- NO COMPARTA esta medicina o se la dé a otra persona. Si usted tiene otras parejas, dígalas que usted está recibiendo tratamiento. También ellos deben recibir un examen y tratamiento.

Efectos secundarios

Estas pastillas son muy seguras y es raro que causen problemas.

Pero si tiene problemas, pueden incluir salpullido, náusea, vómitos*, y/o diarrea. Estos efectos usualmente no son severos ni duran mucho tiempo.

*Si usted vomitó dentro de 2 horas de tomar esta medicina, no funcionará. Vaya a un doctor o clínica para recibir más medicina.

Reacciones alergicas

Aunque es raro, una reacción alergica severa puede incluir: dificultades al respirar/sentir el pecho apretado; la garganta cerrada; hinchazón de la cara, labios o lengua; y/o bolitas con picazón en la piel. Si tiene cualquiera de estos síntomas, llame al 911 o vaya al centro de emergencia más cercano inmediatamente. Después de recibir tratamiento, llame a la clínica o a la línea de ETS para reportar su reacción.

→ **No tenga sexo hasta 7 días después de que usted y su(s) pareja(s) hayan tomado la medicina.** Toma 7 días para curar la infección. Si tiene sexo oral, anal o vaginal durante este tiempo sin condón, o si se rompe el condón, usted puede pasar la infección a sus parejas.

→ **Vaya a un doctor para hacerse un examen completo de las ETS** lo más pronto posible.

→ **Si tiene preguntas, llame a la clínica anotada en su prescripción,** o llame a la línea de ETS al: 1-800-758-0880

→ **Si usted tiene otras parejas** dígalas que usted recibió tratamiento y que ellos deben recibir un examen y tratamiento.

→ **Para más información sobre las ETS** y como hablar con sus parejas visite www.ashastd.org o www.inspotla.org

→ **Si está embarazada** y si no tiene un doctor prenatal, llame al 1-877-597-4777 para información sobre servicios gratis o de bajo costo.

Para preguntas sobre las ETS, exámenes gratis o de bajo costo, y condones gratis,

llame a la línea de ETS al:

1-800-758-0880

or visite


www.lapublichealth.org/std

Para Su Pareja



Medicina Para Curar Gonorrea y Clamidia

¡IMPORTANTE!
¡Lea TODAS estas instrucciones con cuidado!



STD PROGRAM, HEALTH EDUCATION UNIT
PDPT GCCT EXT REV 10/2009